

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน
ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๕) (๗) (๘) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ลงวันที่
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๒ ให้ยาแผนปัจจุบันที่มีตำรับยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือน การเก็บ
รักษา และขนาดบรรจุ ต่อไปนี้เป็นยาสามัญประจำบ้าน

(๑) ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

(๑.๑) ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Aluminium Hydroxide 200-600 mg.

Magnesium Hydroxide 200-400 mg.

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมี

กรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

ขนาดและวิธีใช้ เคี้ยวยาก่อนกลืน รับประทานก่อนอาหาร $\frac{1}{2}$ ช้อนโต๊ะ หรือหลัง

อาหาร ๑ ช้อนโต๊ะ หรือเมื่อมีอาการ

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑-๔ เม็ด

เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑-๒ เม็ด

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่
ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก
แพทย์สั่ง สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ใน
ขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก
แพทย์สั่ง

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐ °C

ขนาดบรรจุ แพ่งพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๒) ยาน้ำลดกรด อะลูมิเนียม-แมกนีเซียม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ

Aluminium Hydroxide 165-650 mg.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Magnesium Hydroxid 103-500 mg. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานก่อนอาหาร $\frac{1}{2}$ ชั่วโมง หรือหลังอาหาร ๑ ชั่วโมง หรือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อมีอาการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑-๔ ซ้อนชา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑-๒ ซ้อนชา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เด็ก ๓-๖ ปี รับประทานครั้งละ $\frac{1}{2}$ -๑ ซ้อนชา

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้อง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก

แพทย์สั่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้

แจ้งคำเตือนดังนี้

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคไต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก

แพทย์สั่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดบรรจุ ขวดละ ๒๔๐ มิลลิลิตร และ ๔๕๐ มิลลิลิตร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑.๓) ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดาบิคาร์บอเนต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Sodium Bicarbonate 300 mg. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Peppermint Oil 0.003 ml.

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ลดอาการระคายเคือง เนื่องจากมีกรดมาก

ในกระเพาะอาหาร

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานหลังอาหาร ๑ ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๓-๖ เม็ด

เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑-๓ เม็ด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก

แพทย์สั่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

(๑.๔) ยาขับลม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสูตรตำรับ ๑๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml.

Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะ

อาหาร

ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รับประทานวันละ ๓-๔ ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ หรือ ๒ ช้อนโต๊ะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑/๒ หรือ ๑ ช้อนโต๊ะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๘๐ มิลลิลิตร ๒๔๐ มิลลิลิตร และ ๔๕๐ มิลลิลิตร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๕) ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับ ๑๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Compound Rhubarb Tincture สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0.50-2.00 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และ/หรือ Tincture อื่น ๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่

Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Compound Tinospora Tincture สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0.50 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml.

Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Nux Vomica Tincture สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0.09-0.10 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml.

และ/หรือ volatile Substance อื่น ๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่

Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Peppermint Oil สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0.03-0.20 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Menthol 0.05-0.30 ml.

Concentrated Dill Water สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0.10 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Camphor สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 19.00 mg. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
 ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา
 ผู้ใหญ่ รับประทานก่อนอาหารวันละ ๓ ครั้ง
 รับประทานครั้งละ ๑ หรือ ๒ ซ้อนโต๊ะ
 เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ $\frac{9}{2}$ หรือ ๑ ซ้อนโต๊ะ

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่มีผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
 ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก
 แพทย์สั่ง

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
 ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๘๐ มิลลิลิตร ๒๔๐ มิลลิลิตร และ ๔๕๐ มิลลิลิตร
 (๑.๖) ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
 ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 Sodium Bicarbonate ๕๐ mg.

โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม
 สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากใน
 กระเพาะอาหาร
 ขนาดและวิธีใช้ ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควรให้
 เกินวันละ ๖ ครั้ง

เด็กอายุ ๒-๓ ปี ครั้งละ ๒-๓ ซ้อนชา
 เด็กอายุ ๖-๑๒ เดือน ครั้งละ ๒ ซ้อนชา
 เด็กอายุ ๑-๖ เดือน ครั้งละ ๑ ซ้อนชา
 ทารกแรกเกิด -๑ เดือน ไม่ควรใช้

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
 ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก
 แพทย์สั่ง

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
 ขนาดบรรจุ ขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร
 (๑.๗) ยาธาตุน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงค์
 ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ
 Asafetida 20 % w/v

สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก
 วิธีใช้ ทาบาง ๆ ที่หน้าท้อง วันละ ๒-๓ ครั้ง
 คำเตือน ห้ามรับประทาน
 การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร ๓๐ มิลลิลิตร และ ๖๐ มิลลิลิตร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๘)^๑ ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซียม-ไซเมธิโคน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Aluminium Hydroxide สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๐ - ๖๐๐ มิลลิกรัม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Magnesium Hydroxide สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๐ - ๔๐๐ มิลลิกรัม

Simethicone ๔๐ - ๑๒๕ มิลลิกรัม

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องเนื่องจากมีกรด
มากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และ
ช่วยขับลม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดและวิธีใช้ เคี้ยวยาก่อนกลืน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานก่อนอาหาร ครั้งชั่วโมง หรือหลังอาหาร ๑ ชั่วโมง
หรือเมื่อมีอาการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ เม็ด

เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้อง
ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์

๓) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด
รับประทานต่อวันไม่เกิน ๕ มิลลิอควิวาเลนท์ (๑๑๕ มิลลิกรัม) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์

๓) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒ ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ แผงละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๙)^๒ ยาน้ำลดกรด อะลูมินา - แมกนีเซียม - ไซเมธิโคน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Aluminium Hydroxide ๑๖๕ - ๖๕๐ มิลลิกรัม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Magnesium Hydroxide ๑๐๓ - ๕๐๐ มิลลิกรัม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Simethicone สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ - ๔๐ มิลลิกรัม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๑ ข้อ ๒ (๑.๘) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ^๒ ข้อ ๒ (๑.๙) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องเนื่องจากมีกรด
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และ
 ช่วยขับลม

ขนาดและวิธีใช้ เขยาขวดก่อนใช้ยา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานก่อนอาหาร ครั้งชั่วโมง หรือหลังอาหาร ๑ ชั่วโมง
 หรือเมื่อมีอาการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ ซ้อนชา
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ ซ้อนชา
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี รับประทานครั้งละ ครั้ง ๑ ซ้อนชา

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้อง
 ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็โรคหัวใจหรือโรคไต
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓) ในกรณีที่ได้รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน

๒ ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานต่อวันไม่เกิน ๕ มิลลิควิวาเลนท์ (๑๑๕ มิลลิกรัม) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็โรคไต
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓) ในกรณีที่ได้รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน

๒ ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดบรรจุ ขวดละ ๒๔๐ และ ๔๕๐ มิลลิลิตร
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๑๐)^๓ ยาผงฟูชนิดไตรคอกไซด์ - โซเดียมไบคาร์บอเนต - โซเดียมคาร์บอเนต
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสูตรตำรับ ๑ ซอง ประกอบด้วยตัวยาสาคัญคือ
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Citric Acid Anhydrous ไม่เกิน ๑.๘๕๐ กรัม
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Sodium Bicarbonate ไม่เกิน ๑.๙๖๐ กรัม
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Sodium Carbonate ไม่เกิน ๐.๔๓๐ กรัม

สรรพคุณ ลดกรด บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากใน
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระเพาะอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดและวิธีใช้ ผสมน้ำก่อนแก้วรับประทาน หลังหมดฟองฟู
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใหญ่และเด็กอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ครั้งละ ๑ ซอง
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานซ้ำได้อีกภายใน ๒ หรือ ๓ ชั่วโมง ถ้าต้องการ

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้อง
 ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไต

^๓ ข้อ ๒ (๑.๑๐) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก

แพทย์สั่ง

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน ๓๐ องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ ซองอะลูมิเนียม ไม่เกิน ๔.๓ กรัม

(๑.๑๑) ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมธิโคน

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Simethicone ๔๐ มิลลิกรัม และ ๘๐ มิลลิกรัม

สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด

ขนาดและวิธีใช้ เคี้ยวก่อนกลืน (เฉพาะชนิดเม็ด)

ขนาด ๔๐ มิลลิกรัม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด

เมื่อมีอาการ วันละ ๔ ครั้ง (ไม่เกินวันละ ๑๒ เม็ด)

ขนาด ๘๐ มิลลิกรัม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด

เมื่อมีอาการ วันละ ๔ ครั้ง (ไม่เกินวันละ ๖ เม็ด)

คำเตือน ๑) หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน ๓ วัน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

๒) ยานี้ไม่ใช่ยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ ชนิดเม็ดบรรจุแผงอะลูมิเนียม

ชนิดแคปซูลบรรจุแผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียม แผงละไม่เกิน ๑๐

เม็ด/แคปซูล

(๒) ยาแก้ท้องเสีย

(๒.๑) ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่

ในสูตรตำรับ ๑ ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

Sodium Chloride ๐.๘๗๕ กรัม

Sodium Bicarbonate ๐.๖๒๕ กรัม

Potassium Chloride ๐.๓๗๕ กรัม

Glucose Anhydrous ๕.๐๐๐ กรัม

หรือ ในสูตรตำรับ ๑ ซองประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Chloride ๐.๘๗๕ กรัม

Trisodium Citrate Dihydrate ๐.๗๒๕ กรัม

Potassium Chloride ๐.๓๗๕ กรัม

Glucose Anhydrous ๕.๐๐๐ กรัม

หรือ ในสูตรตำรับ ๑ ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

Sodium chloride ๐.๖๕๐ กรัม

Trisodium citrate, dihydrate ๐.๗๒๕ กรัม

ข้อ ๒ (๑.๑๑) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๒ (๒.๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

	Potassium chloride	๐.๓๗๕ กรัม
	Glucose, anhydrous	๓.๓๗๕ กรัม
สรรพคุณ	ทดแทนการเสียน้ำในรายที่มีอาการท้องร่วง หรือในรายที่มีอาเจียนมาก ๆ และป้องกันการช็อคเนื่องจากการที่ร่างกายขาดน้ำ	
วิธีใช้	เทผงยาทั้งซองละลายในน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว ประมาณ ๒๕๐ มิลลิลิตร (๑ แก้ว) ให้ดื่มมาก ๆ เมื่อเริ่มมีอาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบ่อยให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียนด้วยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง	
ขนาดการใช้	เด็กอายุมากกว่า ๒ ปี - ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ประมาณ ๑ แก้ว (๒๕๐ มิลลิลิตร) ต่อการถ่ายอุจจาระ ๑ ครั้ง หรือตามความกระหายของผู้ป่วย	
เด็กอ่อน - เด็กอายุ ๒ ปี	ให้ดื่มทีละน้อยสลับกับน้ำเปล่าประมาณวันละ ๔ ชอง หรือมากกว่าที่คนไข้ต้องการและดื่มต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น	
คำเตือน	๑) ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ ๒) ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการอาเจียนมาก เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ความรู้สึก เปลี่ยนแปลงไป หรือหมดสติ ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วน	
การเก็บรักษา	๑) เก็บในที่แห้ง และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ๒) ยาที่ละลายน้ำแล้วเกิน ๒๔ ชั่วโมง ไม่ควรใช้	
ขนาดบรรจุ	๑ ชองสำหรับผสมน้ำ ๒๕๐ มิลลิลิตร	
	(๒.๒) ^๖ ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย	
	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
	Activated charcoal ๒๕๐ - ๓๕๐ มิลลิกรัม	
สรรพคุณ	รักษาอาการท้องเสีย	
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานยานี้ก่อนหรือหลังรับประทานยาอื่น ๆ ๒ ชั่วโมง	
	ผู้ใหญ่ และเด็ก อายุมากกว่า ๒ ปี รับประทานครั้งละ ๓ - ๔ เม็ด วันละ ๓ - ๔ เม็ด	
	(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)	
คำเตือน	๑) ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับยาอื่น ๒) รับประทานยาผงถ่านนี้แล้วอุจจาระจะมีสีค่อนข้างดำ ๓) ถ้าอาการท้องเสียยังไม่ดีขึ้นภายใน ๒ - ๓ วัน หลังรับประทาน	
ยา ควรปรึกษาแพทย์		
การเก็บรักษา	เก็บในแห้ง และอุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส	
ขนาดบรรจุ	แผงละไม่เกิน ๑๐ เม็ด/แคปซูล	
(๓) ยาระบาย		
	(๓.๑) ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับเด็ก	

^๖ ข้อ ๒ (๒.๒) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

ในสูตรตำรับ ๑ แห่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Glycerin สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 91 % w/w สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อถ่าย

สรรพคุณ สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพื่อช่วยการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดและวิธีใช้ ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ ๑ แห่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ ๑๕ นาที
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อให้ตัวยาละลาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ไม่ควรใช้เป็นประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา เก็บในตู้เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดบรรจุ แห่งละ ๑.๕ กรัม บรรจุแผง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓.๒) ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับผู้ใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสูตรตำรับ ๑ แห่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Glycerin 91 % w/w

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรรพคุณ สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพื่อช่วยการ

ข้อถ่าย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดและวิธีใช้ ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ ๑ แห่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ ๑๕ นาที

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ตัวยาละลาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ไม่ควรใช้เป็นประจำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา เก็บในตู้เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดบรรจุ แห่งละ ๒.๕๕ กรัม บรรจุแผง

(๓.๓) ยาระบายแมกนีเซียม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสูตรตำรับ ๑๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Magnesium Hydroxide 1.2 g.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรรพคุณ ยาระบาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๒-๓ ช้อนโต๊ะ (๓๐-๔๕ มิลลิลิตร)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑-๒ ช้อนโต๊ะ (๑๕-๓๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มิลลิลิตร)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เด็ก ๑-๖ ปี รับประทานครั้งละ ๑-๓ ช้อนชา (๕-๑๕ มิลลิลิตร)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้อง หรือคลื่นไส้อาเจียน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นประจำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิระหว่าง ๑๕-๓๐ °C

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดบรรจุ ขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

(๓.๔) ยาระบายมะขามแขก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝักมะขามแขกที่เอาเมล็ดออกแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B 7.5 mg.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรรพคุณ ยาระบาย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดและวิธีใช้	<p>รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า</p> <p>ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๓-๔ เม็ด</p> <p>เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑-๒ เม็ด</p>
คำเตือน	<p>๑) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียน</p> <p>๒) หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา</p> <p>๓) ไม่ควรรับประทานเป็นประจำ</p>
การเก็บรักษา	เก็บในที่แห้ง และอุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐°C
ขนาดบรรจุ	แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด
(๓.๕) ยาระบาย	โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	Sodium Chloride 15 % w/v
สรรพคุณ	สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้สวนทวารให้ถ่ายอุจจาระ
วิธีใช้	สวนเช้าทางทวารหนัก และกลืนไว้จนทนไม่ไหวจึงเข้าส้วม
ผู้ใหญ่	ใช้ครั้งละ ๒๐-๔๐ มิลลิลิตร
เด็ก ๖-๑๒ ปี	ใช้ครั้งละ ๑๐-๒๐ มิลลิลิตร
เด็ก ๑-๖ ปี	ใช้ครั้งละ ๕-๑๐ มิลลิลิตร
คำเตือน	ไม่ควรใช้เป็นประจำ
การเก็บรักษา	เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C
ขนาดบรรจุ	หลอดพลาสติก ๑๐ มิลลิลิตร และ ๒๐ มิลลิลิตร
(๔) ยาถ่ายพยาธิไส้	
(๔.๑) ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล	
ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	Mebendazole 100 mg.
สรรพคุณ	ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม
ขนาดและวิธีใช้	<p>เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน</p> <p>สำหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด</p> <p>ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด</p>
หลังอาหารเย็นเพียงครั้งเดียว	
สำหรับพยาธิตัวกลมอื่น ๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือนและ	
พยาธิแส้ม้า	
ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด	
วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน ๓ วัน และอาจรับประทานซ้ำอีก ๑ เม็ด หลังจากการ	
รักษาครั้งแรก ๒ สัปดาห์ต่อมา	
คำเตือน	๑) ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ในระยะ ๓ เดือนแรก และผู้ที่ เป็นโรคตับ
๒) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี	
การเก็บรักษา	ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ	แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๖ เม็ด
(๕) ยาบรรเทาปวด ลดไข้	

(๕.๑)^๗ (ยกเลิก)

(๕.๒)^๘ ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล ๕๐๐ มก.

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol ๕๐๐ mg

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้ำหนักน้อยกว่า ๓๔	ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
น้ำหนักตั้งแต่ ๓๔ ถึง ๕๐	กินยาครั้งละ ๑ เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า ๕๐ ถึง ๖๗	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน ๕ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้ำหนักมากกว่า ๖๗	กินยาครั้งละ ๒ เม็ด วันละไม่เกิน ๔ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๕ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรรีดยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน

๒. หลีกเลี่ยงการใช้น้ำนี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

๓. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้น้ำนี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต

๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามีด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียม แผงละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

การเก็บรักษา, การแสดงข้อความบนฉลากและเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(๕.๓)^๙ ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล ๓๒๕ มก.

^๗ ข้อ ๒ (๕.๑) ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓)

^๘ ข้อ ๒ (๕.๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol ๓๒๕ mg

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้ำหนักตั้งแต่ ๒๒ ถึง ๓๓	กินยาครั้งละ ๑ เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า ๓๓ ถึง ๔๔	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า ๔๔	กินยาครั้งละ ๒ เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยาเพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน

๒. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

๓. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต

๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด

ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ แพ่งพลาสติกหรืออะลูมิเนียม แผงละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

การเก็บรักษา, การแสดงข้อความบนฉลากและเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(๕.๔)^{๑๐} ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล

ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิกรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol ๑๒๐ mg

โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ขนาดและวิธีใช้

อายุ	ขนาดยา
น้อยกว่า ๒ เดือน	ให้ปรึกษาแพทย์

^๙ ข้อ ๒ (๕.๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

^{๑๐} ข้อ ๒ (๕.๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ ถึง ๓ เดือน ที่มีน้ำหนักตัว ๔ ถึง ๖ กิโลกรัม	กินครั้งละ ครึ่งช้อนชา (หรือ ๒.๕ มิลลิลิตร) วันละ ๑ ครั้ง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ หากจำเป็น กินได้อีกครั้ง ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง ถ้าไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
มากกว่า ๓ เดือน	กินยาเฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ วันละไม่เกิน ๕ ครั้ง แต่แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง ตามขนาดยาในตาราง

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ช้อนตวงยา	กระบอกฉีดยา*
ตั้งแต่ ๔ ถึง ๖	ครึ่งช้อน	๒.๕ มิลลิลิตร
มากกว่า ๖ ถึง ๘	สามส่วนสี่ช้อน	๓.๗๕ มิลลิลิตร
มากกว่า ๘ ถึง ๑๒	หนึ่งช้อน	๕ มิลลิลิตร
มากกว่า ๑๒ ถึง ๑๖	หนึ่งช้อนครึ่ง	๗.๕ มิลลิลิตร
มากกว่า ๑๖ ถึง ๒๔	สองช้อน	๑๐ มิลลิลิตร

* หรือถ้วยตวงยา

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยาเพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบเพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามีด
ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ ขวดสีชา ๓๐ มิลลิลิตร ในกล่องกระดาษพร้อมหลอดหยด

๘(๑.๒ มิลลิลิตร) และขวดสีชา ๖๐ มิลลิลิตร ในกล่องกระดาษ
พร้อมช้อนชา

การเก็บรักษา, การแสดงข้อความบนฉลากและเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(๕.๕) พลาสเตอร์บรรเทาปวด

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทาง
ยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Borneol	0.21-1.00	%w/w
Camphor	1.00-2.80	%w/w
Caoutchouc	30.00	%w/w
Ethylene Glycol Salicylate	2.00-6.00	%w/w
Eucalyptus Oil	0.50	%w/w

Menthol	0.30-6.49	%w/w
Methyl Salicylate	0.14-6.00	%w/w
Peppermint Oil	0.50-2.00	%w/w
Thymol	0.14-0.50	%w/w
Capsaicin Extract	0.65	%w/w
Polybutene	12.00	%w/w
Capsicum Powder	11.00	%w/w
Capsicum Oleoresin	3.00-11.00	%w/w

และ/หรือ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/w

สรรพคุณ ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

วิธีใช้ เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะปิดให้สะอาดและแห้ง ปิดพลาสติกตรง

บริเวณที่มีอาการปวด ควรเปลี่ยนวันละ ๑-๒ ครั้ง

คำเตือน อย่าใช้พลาสติกบริเวณเยื่ออ่อน ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด

การเก็บรักษา เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ๑๐ แผ่น

(๖) ยาแก้แพ้ สดน้ำมูก

(๖.๑) ยาเม็ดแก้แพ้ สดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Chlorpheniramine Maleate 2 mg.

สรรพคุณ บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น้ำมูกไหล

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานทุก ๔-๖ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑-๒ เม็ด ไม่ควรรับประทาน

เกินวันละ ๑๒ เม็ด

เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด ไม่ควรรับประทาน

เกินวันละ ๖ เม็ด

คำเตือน ๑) ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน ๗ วัน

๒) ยานี้ อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับชี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม

การเก็บรักษา เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

(๗) ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

(๗.๑) ยาน้ำแก้ไอ ขับเสมหะสำหรับเด็ก

ในสูตรตำรับ ๕ มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ammonium Carbonate 0.02 g.

Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml.

สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

วิธีใช้ รับประทานวันละ ๓-๔ ครั้ง

เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๒ ช้อนชา (๑๐ มิลลิลิตร)

เด็ก ๓-๖ ปี รับประทานครั้งละ ๑ ช้อนชา (๕ มิลลิลิตร)

เด็ก ๑-๓ ปี รับประทานครั้งละ $\frac{๑}{๒}$ ช้อนชา (๒.๕ มิลลิลิตร)

การเก็บรักษา เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

(๗.๒) ยาแก้ไอน้ำดำ

ในสูตรตำรับ ๕ มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml.

Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg.

Camphorated Opium Tincture 0.6 ml.

สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ และช่วยขับเสมหะ

ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้

รับประทานวันละ ๓-๔ ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑-๒ ช้อนชา (๕-๑๐ มิลลิลิตร)

เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ $\frac{๑}{๒}$ -๑ ช้อนชา (๒.๕-๕ มิลลิลิตร)

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๖ ปี คนชรา และหญิงมีครรภ์

๒) ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกับนานเกิน ๓ วัน

๓) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ...% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

การเก็บรักษา เก็บให้พ้นมือเด็ก และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร

(๘) ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก

(๘.๑) ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ammonium Carbonate 3.40 %w/v

Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 %v/v

สรรพคุณ ดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรือทาผิวหนังบรรเทาอาการ

เนื่องจากพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพิษมีพิษ

วิธีใช้ ใช้ชุบสำลีดม หรือใช้ทา

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร

(๘.๒) ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มี

สรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Menthol 0.07-77.90 %w/v

Camphor 0.45-42.00 %w/v

Methyl Salicylate 3.00-15.00 %w/v

Anise Oil 0.68 %v/v

	Burgamot Oil	0.50-0.68	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Cajuput Oil	0.50-11.00	%v/v
	Cassia Oil	0.50	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Clove Oil	1.25	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Dwarf-Pine Needle Oil	1.00	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Eucalyptus Oil	1.50-23.00	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Lavender Oil	4.69-8.00	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Peppermint Oil	2.20-10.38	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Sage Oil	6.00	%w/v
	Sassafras Oil	5.00	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Turpentine Oil	0.71-8.00	%w/v
	Capsicum Tincture	4.00-8.00	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Myrrh Tincture	1.00	%w/v
	Ratanghia Tincture	0.40	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Terpinol	3.33	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Thymol	0.10	%w/v
	Camphor Spirit	3.00	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Borneo Camphor	9.00	%w/v
	Bornyl Acetate	0.42	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Linalyl Acetate	0.47	%w/v
	Phenyl Salicylate	0.60	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Standard Chamomile Extract	10.00	%w/v
สรรพคุณ	บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ		
วิธีใช้	ใช้สูดดม หรือทาบาง ๆ ตามคอและหน้าอก		
คำเตือน	ห้ามรับประทาน		
การเก็บรักษา	ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด		
ขนาดบรรจุ	ไม่เกิน ๑๔ มิลลิลิตร		
	(หมายเหตุ สามารถทำในรูปยาสูดดมหรือยาน้ำสำหรับสูดดม)		
	(๘.๓) ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้ง		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ที่มี		
	สรรพคุณทางยา หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Menthol	1.35-3.00	%w/w
	Camphor	3.00-9.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Cajuput Oil	3.00	%w/w
	Eucalyptus Oil	0.08-5.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Terpentine Oil	4.68-5.00	%w/w
สรรพคุณ	บรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอื่นเนื่องจากหวัด		

วิธีใช้ ทายาที่บริเวณลำคอ หน้าอกและหลัง

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๕๐ กรัม

(๙) ยาแก้เมารถ เมาเรือ

(๙.๑) ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Dimenhydrinate 50 mg.

สรรพคุณ ใช้ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ

ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย ๓๐

นาที

คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขียานยนต์หรือ

ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๒ เม็ด

(๑๐) ยาสำหรับโรคตา

(๑๐.๑)^{๑๑}(ยกลึก)

(๑๐.๒) ยาล้างตา

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Sodium Chloride ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับยาตา

ได้แก่ Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/v หรือ

Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01 %w/v ปรับ pH

6-8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม และปรับน้ำยาให้เป็น Isotonic กับน้ำตา

สรรพคุณ ใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา อันเนื่องมาจากผง

ควัน สิ่งสกปรก เข้าตา

วิธีใช้ ใช้ล้างตาวินละ ๒-๓ ครั้ง

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๒๔๐ มิลลิลิตร^{๑๒}

(๑๑) ยาสำหรับโรคปากและลำคอ

(๑๑.๑) ยากวาดคอ

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Potassium Iodide 2.50 g.

Iodine 1.25 g.

^{๑๑} ข้อ ๒ (๑๐.๑) ยกลึกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

^{๑๒} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๐.๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

	Ethyl Alcohol (90 percent)	4.00 ml.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Purified Water	2.50 ml.
	Peppermint Oil	0.40 ml.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Glycerin to	100.00 ml.

สรรพคุณ บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ
 วิธีใช้ เติมน้ำสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอในผู้ใหญ่
 คำเตือน ใช้สำหรับกวาดในคอเท่านั้น
 การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร

(๑๑.๒) ยารักษาเส้นเป็นฝ้า เยนเซี่ยนไวโอเล็ต

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Gentian Violet 1 %w/v

สรรพคุณ รักษากระพุ้งแก้มและเส้นเป็นฝ้าขาว
 วิธีใช้ ใช้สำลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ ๒-๓ ครั้ง
 คำเตือน ใช้สำหรับทาในปากเท่านั้น

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐ °C

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร และ ๓๐ มิลลิลิตร

(๑๑.๓) ยาแก้ปวดฟัน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Chlorobutanol 25 g.
 Clove Oil to 100 ml.

สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดฟัน
 วิธีใช้ ใช้ไม้เล็ก ๆ พันสำลีชุบยาอุดฟันตรงที่เป็นรู

คำเตือน ๑) ระวังอย่าให้ถูกบริเวณอื่น
 ๒) ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาทันตแพทย์
 การเก็บรักษา เก็บให้พ้นมือเด็ก และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๘ มิลลิลิตร

(๑๑.๔) ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มี

สรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิด

ผสมกัน ได้แก่

	Abietis Pine Oil	0.30	%v/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Anise Oil	0.25	%w/w
	Borneol	1.66-2.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Cinnamon Oil	0.35	%w/w
	Creosote	0.20	%v/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Eucalyptus Oil	0.15-0.16	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Lemon Oil	0.30-0.52	%v/w

	Menthol	0.06-5.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Peppermint Oil	0.19-3.33	%w/w
	Sylvestris Pine Oil	0.30	%v/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Licorice Extract	7.31-16.67	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Tincture Capsicum	0.02	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Amomum	1.00-4.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Aniseed	2.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Catechu	8.33-38.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Cinnamon	2.00-10.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Clove	0.67-4.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Costus	0.67	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Fennel	1.67-2.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Ginger	2.00-8.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Licorice	26.67-71.38	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Saffron	2.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Saussurea	1.00-3.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Silver Leaf	0.93	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	และ/หรือ Honey	1.50-2.40	%w/w

สรรพคุณ ทำให้ชุ่มคอ บรรเทาอาการระคายคอ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดและวิธีใช้ ใช้อมให้ละลายช้า ๆ ครั้งละ ๑-๕ เม็ด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๑๐๐ เม็ด หรือ ไม่เกิน ๓๐ กรัม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๑.๕)^{๑๓} ยามบรรเทาอาการเจ็บคอ

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรรพคุณ บรรเทาอาการเจ็บคอ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อมครั้งละ ๑ เม็ดให้ละลายช้า ๆ ในปาก ทุก ๒-๓ ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผน

ปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์ที่เป็นยาสามัญพิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^{๑๓} ข้อ ๒ (๑๑.๕) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๑) หากใช้ติดต่อกัน ๒ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

๒) หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

๓) ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี

การเก็บรักษา เก็บยาในตู้ฉนวนหุ้มไม่เกิน 30 °C
ขนาดบรรจุ แผงอลูมิเนียมหรือแผงพลาสติกละไม่เกิน ๘ เม็ด
(๑๒) ยาใส่แผล ล้างแผล

(๑๒.๑) ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Iodine 2.0-2.5 %w/v
Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v

สรรพคุณ รักษาแผลสด

วิธีใช้ ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล

คำเตือน ๑) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา

๒) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐ °C

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร และ ๓๐ มิลลิลิตร

(๑๒.๒) ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอล

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Thimerosal 0.1 % w/v

สรรพคุณ รักษาบาดแผล

วิธีใช้ ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล

คำเตือน ๑) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา

๒) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐ °C

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร และ ๓๐ มิลลิลิตร

(๑๒.๓) ยาใส่แผล โปวีโดน - ไอโอดีน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Povidone-Iodine 10 % w/v

equivalent to Iodine 1.0 % w/v

สรรพคุณ รักษาแผลสด

วิธีใช้ ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล

คำเตือน ๑) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา

๒) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐ °C

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิลิตร^{๑๔}

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๒.๔) ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Isopropyl Alcohol Solution 70 % v/v

โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล

วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล

คำเตือน ห้ามรับประทาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร^{๑๕}

สำนักงาน (๑๒.๕) ยาเอทิล แอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Ethyl Alcohol Solution 70% v/v สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล

วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล

คำเตือน ห้ามรับประทาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร^{๑๖}

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๒.๖) น้ำเกลือล้างแผล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Sodium Chloride 0.9 % w/v สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดบาดแผล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐ °C

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๑ ลิตร^{๑๗}

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๒.๗) น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Chloroxylenol ร้อยละ ๔.๘ โดยน้ำหนักต่อปริมาตร

^{๑๔} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๒.๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

^{๑๕} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๒.๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

^{๑๖} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๒.๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

^{๑๗} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๒.๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

^{๑๘} ข้อ ๒ (๑๒.๗) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

Isopropyl Alcohol Solution ร้อยละ ๑๒ โดยปริมาตร

สรรพคุณ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล

วิธีใช้ ห้ามใส่แผลโดยตรง

เจือจางน้ำยา ๑ ส่วนกับน้ำ ๑๙ ส่วน ใช้เช็ดทำความสะอาดรอบ

บาดแผล

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร

(๑๓) ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

(๑๓.๑)^{๑๙} (ยกลีก)

(๑๓.๒)^{๒๐} (ยกลีก)

(๑๔) ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แผลงัดต่อ

(๑๔.๑) ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Methyl Salicylate	1.14-50.00 %w/w
Camphor	1.76-25.00 %w/w
Menthol	3.00-20.00 %w/w
Cinnamon Oil	1.00-2.40 %w/w
Clove Oil	0.50-5.00 %v/w
Eucalyptus Oil	1.50-13.70 %v/w
Peppermint Oil	0.70-16.00 %w/w
Terpentine Oil	2.00-3.80 %v/w
Capsicum Tincture	0.80-8.00 %v/v
Colophony	2.51 %v/w

สรรพคุณ บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ เนื่องจากแผลงัดต่อหรือปวด

เมื่อยกล้ามเนื้อ

วิธีใช้ ทาและนวดบริเวณที่มีอาการ

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๓๐ กรัม

(๑๕) ยาสำหรับโรคผิวหนัง

(๑๕.๑) ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

^{๑๙} ข้อ ๒ (๑๓.๑) ยกลีกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

^{๒๐} ข้อ ๒ (๑๓.๒) ยกลีกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

Benzyl Benzoate 25 % w/v

สรรพคุณ รักษาหิด เหา และโลน
 วิธีใช้ เช็ดขูดก่อนใช้ยา สำหรับเด็กเล็กให้แบ่งยามาเติมน้ำเท่าตัวแล้วผสมให้เข้ากัน
 สำหรับรักษาหิด
 อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อน ๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน แล้วทายานี้ให้ทั่วทั้งไว้ ๒๔ ชั่วโมง แล้วจึงอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นให้ทาซ้ำใหม่อีกครั้งตามวิธีเดิม
 สำหรับรักษาเหาและโลน
 ใส่น้ำให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณที่มีเหาหรือโลน ทั้งไว้ ๑ วัน ถ้าเป็นมากให้ใช้ยา ๒ ครั้งต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมื่อครบ ๗ วันให้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่หายให้ใส่ยาซ้ำตามวิธีเดิม

คำเตือน ระงับอย่าให้ยาเข้าตา

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๒๕°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดสีชา ๓๐ มิลลิลิตร และ ๖๐ มิลลิลิตร

(๑๕.๒) ยารักษาหิด ขี้ผึ้งกำมะถัน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sublimed Sulphur 10 %w/w

สรรพคุณ รักษาโรคหิด

วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิด วันละ ๒-๓ ครั้ง

คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ หลอดละ ๕ กรัม และ ๑๕ กรัม

(๑๕.๓) ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Benzoic Acid 2.5-6.5 % w/w

Salicylic Acid 3.0-5.0 % w/w

สรรพคุณ รักษา กลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า

วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ ๒-๓ ครั้ง

คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ หลอดละ ๕ กรัม และ ๑๕ กรัม

(๑๕.๔) ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Coal Tar 1 % w/w

สรรพคุณ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังบางชนิด เช่น เรื้อนกวาง ผื่นหนังเป็นผื่นคัน

วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ ๒-๓ ครั้ง

คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ หลอดหรือขวดละ ๕ กรัม และ ๑๕ กรัม

(๑๕.๕) ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Calamine 8-15 % w/v

Zinc Oxide 3-12 % w/v

สรรพคุณ บรรเทาอาการคันเนื่องจากผดผื่นคัน สมพิษ

วิธีใช้ เช็ดทาบริเวณที่คัน ใช้ยา ทาบริเวณที่เป็นวันละ ๓-๔ ครั้ง

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๑๘๐ มิลลิลิตร^๒

(๑๕.๖) ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Thiosulfate 100 % w/w

สรรพคุณ รักษาเกลื้อน

วิธีใช้ เติมน้ำสะอาดจนถึงคอขวด เขย่าผสมกันจนตัวยาละลายหมด

(จะได้ความเข้มข้นประมาณ ๒๕%) ใช้ทาบริเวณที่เป็นเกลื้อน หลังอาบน้ำวันละหลายครั้ง

คำเตือน ยาที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ภายใน ๑๕ วัน

การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ กรัม สำหรับผสมน้ำเป็น ๖๐ มิลลิลิตร

(๑๖) ยาบำรุงร่างกาย

(๑๖.๑) ยาเม็ดวิตามินบีรวม

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 5 mg.

Pyridoxine Hydrochloride 2 mg.

Riboflavine 2 mg.

Nicotinamide 20 mg.

สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามินบี และบำรุงร่างกาย

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานวันละ ๑ ครั้งหลังอาหาร

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑-๒ เม็ด

เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด

การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

(๑๖.๒) ยาเม็ดวิตามินซี

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ascorbic Acid 100 mg.

สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามินซี

^๒ ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๕.๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

ขนาดและวิธีใช้	รับประทานวันละ ๑ ครั้ง	
	ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด	
	เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด	
คำเตือน	ห้ามใช้เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี	
การเก็บรักษา	เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	
ขนาดบรรจุ	แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด	
	(๑๖.๓) ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต	
	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
	Ferrous Sulfate Equivalent to Iron	60 mg.
สรรพคุณ	รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่	
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ ๑-๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร	
คำเตือน	๑) ในช่วงรับประทานยาอาจจะมีสีดำ	
	๒) หากเกิดอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้ ควรรับประทานยาพร้อม	
	อาหารหรือค่อย ๆ เพิ่มขนาดของยาจนถึงขนาดที่แนะนำให้ใช้	
การเก็บรักษา	เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C	
ขนาดบรรจุ	แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด	
	(๑๖.๔) ยาเม็ดวิตามินรวม	
	ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
	Vitamin A	2,500 I.U.
	Vitamin D	300 I.U.
	Vitamin C	15.00 mg.
	Vitamin B1 Mononitrate	1.00 mg.
	Vitamin B2	0.50 mg.
	Nicotinamide	7.50 mg.
สรรพคุณ	ป้องกันการขาดวิตามินสำหรับผู้ใหญ่	
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานวันละ ๑ เม็ด	
คำเตือน	ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกิน	
	ขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาาน นอกจาก	
	แพทย์สั่ง	
การเก็บรักษา	เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	
ขนาดบรรจุ	แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด	
	(๑๖.๕) น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล	
	ในสูตรตำรับ ๑ แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
	Cod Liver Oil equivalent to	
	Vitamin A	ไม่เกิน 4,000 I.U.
	Vitamin D	ไม่เกิน 300 I.U.
สรรพคุณ	ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D	
ขนาดและวิธีใช้	ผู้ใหญ่รับประทานวันละ ๑ เม็ด	

คำเตือน ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง

การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด (๑๖.๖) น้ำมันตับปลาชนิดน้ำ

ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Cod Liver Oil equivalent to

Vitamin A	ไม่เกิน	4,000 I.U.
Vitamin D	ไม่เกิน	300 I.U.

สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D

ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้

เด็กอายุตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป รับประทานวันละ ๑ ช้อนชา

เด็กอายุ ๑-๔ ปี รับประทานวันละ $\frac{9}{16}$ ช้อนชา

เด็กแรกเกิด - ๑ ปี รับประทานวันละ $\frac{9}{16}$ ช้อนชา

คำเตือน ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง

การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๒๐ มิลลิลิตร ๒๕๐ มิลลิลิตร และ ๕๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๓ ฉลากยาสามัญประจำบ้านตามประกาศฉบับนี้ต้องแสดง

๓.๑ ชื่อยาตามที่ระบุในประกาศนี้ กรณีมีชื่อการค้าต้องแสดงชื่อตามประกาศควบคู่กับชื่อทางการค้าด้วย

๓.๒ คำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” ในกรอบสี่เหลี่ยมมีขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ชัดเจน

๓.๓ คำว่า “ยาสี้นอายุ” และแสดงวัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ยาสี้นอายุ

๓.๔ ชื่อความอื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕ (๓) หรือมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔ ยาสามัญประจำบ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านต่อไปได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันที่ประสงค์จะทำการผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาสามัญประจำบ้านยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยมีสูตรตำรับยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือน การเก็บรักษา

และขนาดบรรจุ ตามประกาศฉบับนี้ เมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วจึงจะผลิตหรือนำ
สั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรได้

ข้อ ๖ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันที่มี
ตำรับยาตามประกาศฉบับนี้ และได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับที่
ประสงค์จะได้ตำรับยานั้น เป็นยาสามัญประจำบ้านโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอแก้ไข
รายการทะเบียนตำรับยา ภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๗^{๒๒} ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

