

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๕) (๗) (๘) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๒ ให้ยาแผนปัจจุบันที่มีตำรับยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คำเตือน การเก็บรักษา และขนาดบรรจุ ต่อไปนี้เป็นยาสามัญประจำบ้าน

(๑) ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

(๑.๑) ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา - แมกนีเซียม

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ

Aluminium Hydroxide 200 - 600 mg.

Magnesium Hydroxide 200 - 400 mg.

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมี

กรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

ขนาดและวิธีใช้ เคี้ยวยาก่อนกลืน รับประทานก่อนอาหาร ๑ ชั่วโมง หรือหลัง

อาหาร ๑ ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ เม็ด

เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๒) ยาน้ำลดกรด อะลูมินา - แมกนีเซีย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Aluminium Hydroxide 165 - 650 mg.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Magnesium Hydroxid 103 - 500 mg. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมี

กรดมากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานก่อนอาหาร $\frac{1}{2}$ ชั่วโมง หรือหลังอาหาร ๑ ชั่วโมง หรือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อมีอาการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ ซ้อนชา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ ซ้อนชา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เด็ก ๓ - ๖ ปี รับประทานครั้งละ $\frac{1}{2}$ - ๑ ซ้อนชา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้อง ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก

แพทย์สั่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้

แจ้งคำเตือนดังนี้

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคไต

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก

แพทย์สั่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดบรรจุ ขวดละ ๒๔๐ มิลลิลิตร และ ๔๕๐ มิลลิลิตร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑.๓) ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดาบิคาร์บอเนต

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Sodium Bicarbonate 300 mg. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Peppermint Oil 0.003 ml.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ลดอาการระคายเคือง เนื่องจากมีกรดมาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกระเพาะอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดและวิธีใช้ รับประทานหลังอาหาร ๑ ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๓ - ๖ เม็ด

เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๓ เม็ด

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แพทย์สั่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

(๑.๔) ยาขับลม

ในสูตรตำรับ ๑๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Capsicum Tincture 0.060 - 0.500 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Compound Cardamom Tincture 0.035 - 1.800 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Strong Ginger Tincture 0.024 - 0.240 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะอาหาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาหาร

ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รับประทานวันละ ๓-๔ ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ หรือ ๒ ซ้อนโต๊ะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ $\frac{๑}{๒}$ หรือ ๑ ซ้อนโต๊ะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาดำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๘๐ มิลลิลิตร ๒๔๐ มิลลิลิตร และ ๔๕๐ มิลลิลิตร

(๑.๕) ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง

ในสูตรตำรับ ๑๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และ/หรือ Tincture อื่น ๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Compound Tinospora Tincture 0.50 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และ/หรือ volatile Substance อื่น ๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่

Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Peppermint Oil 0.03-0.20 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Menthol 0.05-0.30 ml.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Concentrated Dill Water 0.10 ml. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Camphor 19.00 mg. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
 ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา
 ผู้ใหญ่ รับประทานก่อนอาหารวันละ ๓ ครั้ง
 รับประทานครั้งละ ๑ หรือ ๒ ซ้อนโต๊ะ
 เด็ก ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ $\frac{9}{2}$ หรือ ๑ ซ้อนโต๊ะ

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่มีผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
 ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก
 แพทย์สั่ง

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
 ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๘๐ มิลลิลิตร ๒๔๐ มิลลิลิตร และ ๔๕๐ มิลลิลิตร
 (๑.๖) ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต

ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 Sodium Bicarbonate ๕๐ mg.

โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม
 สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากใน

กระเพาะอาหาร
 ขนาดและวิธีใช้ ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควรให้
 เกินวันละ ๖ ครั้ง

เด็กอายุ ๒ - ๓ ปีครั้งละ ๒-๓ ซ้อนชา
 เด็กอายุ ๖ - ๑๒ เดือน ครั้งละ ๒ ซ้อนชา
 เด็กอายุ ๑ - ๖ เดือน ครั้งละ ๑ ซ้อนชา
 ทารกแรกเกิด - ๑ เดือน ไม่ควรใช้

คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
 ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก

แพทย์สั่ง
 การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร
 (๑.๗) ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงค์

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ
 Asafetida 20 % w/v

สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก
 วิธีใช้ ทาบาง ๆ ที่หน้าท้อง วันละ ๒-๓ ครั้ง

คำเตือน ห้ามรับประทาน
 การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร ๓๐ มิลลิลิตร และ ๖๐ มิลลิลิตร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๘)^๑ ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา - แมกนีเซียม - ไฮเมธิโคน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Aluminium Hydroxide สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๐ - ๖๐๐ มิลลิกรัม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Magnesium Hydroxide สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐๐ - ๔๐๐ มิลลิกรัม

Simethicone ๔๐ - ๑๒๕ มิลลิกรัม

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องเนื่องจากมีกรด
มากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ช่วยขับลม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดและวิธีใช้ เคี้ยวยาก่อนกลืน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานก่อนอาหาร ครั้งชั่วโมง หรือหลังอาหาร ๑ ชั่วโมง
หรือเมื่อมีอาการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ เม็ด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้อง
ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์

๓) ในกรณีที่ได้รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด
รับประทานต่อวันไม่เกิน ๕ มิลลิอิกวาเลนท์ (๑๑๕ มิลลิกรัม) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์

๓) ในกรณีที่ได้รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน

๒ ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดบรรจุ แผงละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๙)^๒ ยาน้ำลดกรด อะลูมินา - แมกนีเซียม - ไฮเมธิโคน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Aluminium Hydroxide ๑๖๕ - ๖๕๐ มิลลิกรัม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Magnesium Hydroxide ๑๐๓ - ๕๐๐ มิลลิกรัม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Simethicone ๒๐ - ๕๐ มิลลิกรัม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๑ ข้อ ๒ (๑.๘) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

^๒ ข้อ ๒ (๑.๙) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องเนื่องจากมีกรด
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มากในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ และ
 ช่วยขับลม

ขนาดและวิธีใช้ เขยาขวดก่อนใช้ยา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานก่อนอาหาร ครั้งชั่วโมง หรือหลังอาหาร ๑ ชั่วโมง
 หรือเมื่อมีอาการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๔ ซ้อนชา
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ ซ้อนชา
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี รับประทานครั้งละ ครั้ง ๑ ซ้อนชา

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้อง
 ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน

๒ ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานต่อวันไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมวาเลนท์ (๑๑๕ มิลลิกรัม) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคไต
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓) ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควรรับประทานห่างกัน

๒ ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดบรรจุ ขวดละ ๒๔๐ และ ๔๕๐ มิลลิลิตร
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๑๐)^๓ ยามผงฟูซิตริกแอซิด - โซเดียมไบคาร์บอเนต - โซเดียมคาร์บอเนต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสูตรตำรับ ๑ ซอง ประกอบด้วยตัวยาสาคัญคือ
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Citric Acid Anhydrous ไม่เกิน ๑.๘๕๐ กรัม
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Sodium Bicarbonate ไม่เกิน ๑.๙๖๐ กรัม
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Sodium Carbonate ไม่เกิน ๐.๔๓๐ กรัม

สรรพคุณ ลดกรด บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากใน
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระเพาะอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดและวิธีใช้ ผสมน้ำก่อนแก้วรับประทาน หลังหมดฟองฟู
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใหญ่และเด็กอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ครั้งละ ๑ ซอง
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานซ้ำได้อีกภายใน ๒ หรือ ๓ ชั่วโมง ถ้าต้องการ

(โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้อง
 ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้ในผู้ที่ เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไต

^๓ ข้อ ๒ (๑.๑๐) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

๒) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า ๒ สัปดาห์ นอกจาก

แพทย์สั่ง

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน ๓๐ องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ ซองอะลูมิเนียม ไม่เกิน ๔.๓ กรัม

(๑.๑๑)^๔ ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมธิโคน

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Simethicone ๔๐ มิลลิกรัม และ ๘๐ มิลลิกรัม

สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด

ขนาดและวิธีใช้ เคี้ยวก่อนกลืน (เฉพาะชนิดเม็ด)

ขนาด ๔๐ มิลลิกรัม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด

เมื่อมีอาการ วันละ ๔ ครั้ง (ไม่เกินวันละ ๑๒ เม็ด)

ขนาด ๘๐ มิลลิกรัม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด

เมื่อมีอาการ วันละ ๔ ครั้ง (ไม่เกินวันละ ๖ เม็ด)

คำเตือน ๑) หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน ๓ วัน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

๒) ยานี้ไม่ใช่ยาลดกรดเคลื่อนที่ในกระเพาะอาหาร

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ ชนิดเม็ดบรรจุแผงอะลูมิเนียม

ชนิดแคปซูลบรรจุแผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียม แผงละไม่เกิน ๑๐

เม็ด/แคปซูล

(๑.๑๒)^๕ ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรด

ไหลย้อนชนิดเม็ด

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium alginate ๒๕๐ - ๕๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่

เหมาะสม

Sodium bicarbonate ๙๕ - ๓๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่

เหมาะสม

Calcium carbonate ๗๐ - ๓๖๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่

เหมาะสม

(ปริมาณอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาดำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์)

สรรพคุณ ๑. บรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยว

และอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน หรือ

๒. บรรเทาอาการแสบร้อน บริเวณกลางอก ร่วมกับ

เรอเปรี้ยวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ในกรณีที่มีค่า

^๔ ข้อ ๒ (๑.๑๑) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

^๕ ข้อ ๒ (๑.๑๒) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ความสามารถในการสะเทินกรดในกระเพาะอาหาร (Acid Neutralizing Capacity : ANC) ไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิควิวาเลนซ์ (mEq) ต่อขนาดการใช้ยาหนึ่งครั้ง

ขนาดบรรจุ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๒๐ เม็ด

คำเตือนในฉลาก ๑. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคไต ต้องปรึกษาแพทย์

ก่อนใช้ยา

๒. หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแย่ลงให้หยุดยา

และไปพบแพทย์ทันที

๓. ในกรณีที่ได้รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควร

รับประทานห่างกัน ๒ ชั่วโมง

ในกรณีที่มีการใช้แอสปาแตมเป็นสารให้ความ

หวาน ให้ระบุคำเตือนเพิ่มเติมดังนี้

๔. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟิโนลคิโตนูเรีย ยานี้มี

ส่วนประกอบของแอสปาแตม

ขนาดและวิธีใช้ คำเตือนบนเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน การเก็บรักษาการแสดงข้อความอื่นบนเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(โดยให้แนบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนไปกับทุกขนาดบรรจุที่ถึงมือผู้บริโภค)

(๑.๑๓)^๖ ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำ

ในสูตรตำรับ ๑๐ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Sodium alginate ๒๕๐ - ๕๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่

เหมาะสม

Sodium bicarbonate ๙๕ - ๓๐๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่

เหมาะสม

Calcium carbonate ๗๐ - ๓๖๐ มิลลิกรัม หรือในปริมาณอื่นที่

เหมาะสม

(ปริมาณอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์)

สรรพคุณ ๑. บรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกร่วมกับเรอเปรี้ยว และ

อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน หรือ

เรอเปรี้ยวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน และลดกรดในกระเพาะอาหาร ในกรณีที่มีค่า

ความสามารถในการสะเทินกรดในกระเพาะอาหาร (Acid Neutralizing Capacity : ANC) ไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิควิวาเลนซ์ (mEq) ต่อขนาดการใช้ยาหนึ่งครั้ง

ขนาดบรรจุ ภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิลิตร

^๖ ข้อ ๒ (๑.๑๓) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

คำเตือนในฉลาก ๑. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคไต ต้องปรึกษาแพทย์
ก่อนใช้ยา

๒. หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือแย่ลงให้หยุดยา
และไปพบแพทย์ทันที

๓. ในกรณีที่รับประทานยานี้ร่วมกับยาอื่น ควร
รับประทานห่างกัน ๒ ชั่วโมง

ในกรณีที่มีการใช้แอสปาแตมเป็นสารให้ความ
หวาน ให้ระบุดำเตือนเพิ่มเติมดังนี้

๔. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีสภาวะฟิโนลคีโทนูเรีย ยานี้มี
ส่วนประกอบของแอสปาแตม

ขนาดและวิธีใช้ คำเตือนบนเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน การเก็บ
รักษาการแสดงข้อความอื่นบนเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(โดยให้แนบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนไปกับทุกขนาดบรรจุที่
ถึงมือผู้บริโภค)

(๒) ยาแก้ท้องเสีย

(๒.๑)^๗ ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่
ในสูตรตำรับ ๑ ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

Sodium Chloride	๐.๘๗๕ กรัม
Sodium Bicarbonate	๐.๖๒๕ กรัม
Potassium Chloride	๐.๓๗๕ กรัม
Glucose Anhydrous	๕.๐๐๐ กรัม

หรือ ในสูตรตำรับ ๑ ซองประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Chloride	๐.๘๗๕ กรัม
Trisodium Citrate Dihydrate	๐.๗๒๕ กรัม
Potassium Chloride	๐.๓๗๕ กรัม
Glucose Anhydrous	๕.๐๐๐ กรัม

หรือ ในสูตรตำรับ ๑ ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

Sodium chloride	๐.๖๕๐ กรัม
Trisodium citrate, dihydrate	๐.๗๒๕ กรัม
Potassium chloride	๐.๓๗๕ กรัม
Glucose, anhydrous	๓.๓๗๕ กรัม

สรรพคุณ ทดแทนการเสียน้ำในรายที่มีอาการท้องร่วง หรือในรายที่มี
อาเจียนมาก ๆ และป้องกันการช็อคเนื่องจากการที่ร่างกายขาดน้ำ

วิธีใช้ เทผงยาทั้งซองละลายในน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว
ประมาณ ๒๕๐ มิลลิลิตร (๑ แก้ว) ให้ดื่มมาก ๆ เมื่อเริ่มมีอาการ

^๗ ข้อ ๒ (๒.๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผน
ปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

ห้องรวม ถ้าถ่ายบ่อยให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียนด้วยให้ดื่มทีละ
 น้อยแต่บ่อยครั้ง

ขนาดการใช้ เด็กอายุมากกว่า ๒ ปี - ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ประมาณ
 ๑ แก้ว (๒๕๐ มิลลิลิตร) ต่อการถ่ายอุจจาระ ๑ ครั้ง หรือตาม
 ความกระหายของผู้ป่วย

เด็กอ่อน - เด็กอายุ ๒ ปี ให้ดื่มทีละน้อยสลับกับน้ำเปล่าประมาณวันละ ๔ ชอง หรือ
 มากพอที่คนไข้ต้องการและดื่มต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น

คำเตือน ๑) ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
 ๒) ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการอาเจียนมาก เหงื่อออกมาก ตัวเย็น
 ความรู้สึก เปลี่ยนแปลงไป หรือหมดสติ ควรนำผู้ป่วยส่ง
 โรงพยาบาลโดยด่วน

การเก็บรักษา ๑) เก็บในที่แห้ง และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
 ๒) ยาที่ละลายน้ำแล้วเกิน ๒๔ ชั่วโมง ไม่ควรใช้

ขนาดบรรจุ ๑ ชองสำหรับผสมน้ำ ๒๕๐ มิลลิลิตร
 (๒.๒) ยามงถานรักษาอาการท้องเสีย

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 Activated charcoal ๒๕๐ - ๓๕๐ มิลลิกรัม

สรรพคุณ รักษาอาการท้องเสีย

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานยานี้ก่อนหรือหลังรับประทานยาอื่น ๆ ๒ ชั่วโมง
 ผู้ใหญ่ และเด็ก อายุมากกว่า ๒ ปี รับประทานครั้งละ ๓ - ๔ เม็ด วันละ ๓ - ๔ เม็ด
 (โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาดที่ถูกต้อง
 ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน ๑) ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับยาอื่น
 ๒) รับประทานยามงถานี้แล้วอุจจาระจะมีสีค่อนข้างดำ
 ๓) ถ้าอาการท้องเสียยังไม่ดีขึ้นภายใน ๒ - ๓ วัน หลังรับประทาน
 ยา ควรปรึกษาแพทย์

การเก็บรักษา เก็บในแห้ง และอุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส
 ขนาดบรรจุ แผงละไม่เกิน ๑๐ เม็ด/แคปซูล

(๓) ยาระบาย

(๓.๑) ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับเด็ก

ในสูตรตำรับ ๑ แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 Glycerin 91 % w/w

สรรพคุณ สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพื่อช่วยการ
 ขับถ่าย

ขนาดและวิธีใช้ ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ ๑ แท่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ ๑๕ นาที
 เพื่อให้ตัวยาละลาย

^{๒๒} ข้อ ๒ (๒.๒) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

	คำเตือน	ไม่ควรใช้เป็นประจำ
	การเก็บรักษา	เก็บในตู้เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
	ขนาดบรรจุ	แท่งละ ๑.๕ กรัม บรรจุแผง
		(๓.๒) ยาระบายกลีเซอรินชนิดเหน็บทวารสำหรับผู้ใหญ่
		ในสูตรตำรับ ๑ แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
		Glycerin 91 % w/w
	สรรพคุณ	สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพื่อช่วยการขับถ่าย
	ขนาดและวิธีใช้	ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ ๑ แท่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ ๑๕ นาที เพื่อให้ตัวยาละลาย
	คำเตือน	ไม่ควรใช้เป็นประจำ
	การเก็บรักษา	เก็บในตู้เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
	ขนาดบรรจุ	แท่งละ ๒.๕๕ กรัม บรรจุแผง
		(๓.๓) ยาระบายแมกนีเซีย
		ในสูตรตำรับ ๑๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
		Magnesium Hydroxide 1.2 g.
	สรรพคุณ	ยาระบาย
	ขนาดและวิธีใช้	เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๒-๓ ช้อนโต๊ะ (๓๐-๔๕ มิลลิลิตร) เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑-๒ ช้อนโต๊ะ (๑๕-๓๐ มิลลิลิตร) เด็ก ๑-๖ ปี รับประทานครั้งละ ๑-๓ ช้อนชา (๕-๑๕ มิลลิลิตร)
	คำเตือน	๑) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้ อาเจียน ๒) ไม่ควรรับประทานเป็นประจำ
	การเก็บรักษา	เก็บในที่อุณหภูมิระหว่าง ๑๕-๓๐ °C
	ขนาดบรรจุ	ขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร และ ๑๒๐ มิลลิลิตร
		(๓.๔) ยาระบายมะขามแขก
		ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
		ฝักมะขามแขกที่เอาเมล็ดออกแล้ว
		ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B 7.5 mg.
	สรรพคุณ	ยาระบาย
	ขนาดและวิธีใช้	รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๓-๔ เม็ด เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑-๒ เม็ด
	คำเตือน	๑) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้ อาเจียน ๒) หลีกเลี่ยงมีครรภ์หรือให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา ๓) ไม่ควรรับประทานเป็นประจำ

การเก็บรักษา เก็บในที่แห้ง และอุณหภูมิต่ำกว่า ๓๐°C

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

(๓.๕) ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Chloride 15 % w/v

สรรพคุณ สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้สวนทวารให้ถ่ายอุจจาระ

วิธีใช้ สวนเข้าทางทวารหนัก และกลืนไว้จนทนไม่ไหวจึงเข้าส้วม

ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ ๒๐-๔๐ มิลลิลิตร

เด็ก ๖-๑๒ ปี ใช้ครั้งละ ๑๐-๒๐ มิลลิลิตร

เด็ก ๑-๖ ปี ใช้ครั้งละ ๕-๑๐ มิลลิลิตร

คำเตือน ไม่ควรใช้เป็นประจำ

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก ๑๐ มิลลิลิตร และ ๒๐ มิลลิลิตร

(๔) ยาถ่ายพยาธิไส้

(๔.๑) ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Mebendazole 100 mg.

สรรพคุณ ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม

ขนาดและวิธีใช้ เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน

สำหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด

ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด

หลังอาหารเย็นเพียงครั้งเดียว

สำหรับพยาธิตัวกลมอื่น ๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือนและ

พยาธิแส้ม้า

ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด

วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน ๓ วัน และอาจรับประทานซ้ำอีก ๑ เม็ด หลังจากการ

รักษาครั้งแรก ๒ สัปดาห์ต่อมา

คำเตือน

๑) ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ในระยะ ๓ เดือนแรก และผู้ที่ เป็นโรคตับ

๒) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี

การเก็บรักษา

ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๖ เม็ด

(๕) ยาบรรเทาปวด ลดไข้

(๕.๑)^๙ (ยกเลิก)

(๕.๒)^{๑๐} ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล ๕๐๐ มก.

(ฉบับที่ ๓)

^๙ ข้อ ๒ (๕.๑) ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

^{๑๐} ข้อ ๒ (๕.๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol ๕๐๐ mg

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้ำหนักน้อยกว่า ๓๔	ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
น้ำหนักตั้งแต่ ๓๔ ถึง ๕๐	กินยาครั้งละ ๑ เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า ๕๐ ถึง ๖๗	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง วันละไม่เกิน ๕ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้ำหนักมากกว่า ๖๗	กินยาครั้งละ ๒ เม็ด วันละไม่เกิน ๔ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน

๒. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

๓. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากมีสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต

๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามีด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุกรรม แผงพลาสติกหรืออะลูมิเนียม แผงละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

การเก็บรักษา, การแสดงข้อความบนฉลากและเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(๕.๓)^{๑๑} ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล ๓๒๕ มก.

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol ๓๒๕ mg

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

^{๑๑} ข้อ ๒ (๕.๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสამัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

ขนาดและวิธีใช้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้ำหนักตั้งแต่ ๒๒ ถึง ๓๓	กินยาครั้งละ ๑ เม็ด แต่แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า ๓๓ ถึง ๔๔	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่ง แต่แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
น้ำหนักมากกว่า ๔๔	กินยาครั้งละ ๒ เม็ด แต่แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยาเพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน

๒. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

๓. ปรีกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากมีสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต

๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามีด

ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
ขนาดบรรจุ แพ่งพลาสติกหรืออะลูมิเนียม แผงละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

การเก็บรักษา, การแสดงข้อความบนฉลากและเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(๕.๔)^{๑๒} ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล
ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Paracetamol ๑๒๐ mg

โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม
สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

ขนาดและวิธีใช้

อายุ	ขนาดยา
น้อยกว่า ๒ เดือน	ให้ปรึกษาแพทย์
๒ ถึง ๓ เดือน ที่มีน้ำหนักตัว ๔ ถึง ๖ กิโลกรัม	กินครั้งละ ครั้งซ็อนซา (หรือ ๒.๕ มิลลิลิตร) วันละ ๑ ครั้ง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ หากจำเป็น กินได้อีกครั้ง ห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย

^{๑๒} ข้อ ๒ (๕.๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

	๔ ชั่วโมง ถ้าไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร	
มากกว่า ๓ เดือน	กินยาเฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ วันละไม่เกิน ๕ ครั้ง แต่แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง ตามขนาดยาในตาราง	
	น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ช้อนตวงยา
	ตั้งแต่ ๔ ถึง ๖	ครึ่งช้อน
	มากกว่า ๖ ถึง ๘	สามส่วนสี่ช้อน
	มากกว่า ๘ ถึง ๑๒	หนึ่งช้อน
	มากกว่า ๑๒ ถึง ๑๖	หนึ่งช้อนครึ่ง
	มากกว่า ๑๖ ถึง ๒๔	สองช้อน
	* หรือถ้วยตวงยา	

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา

๑. ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยาเพราะ

จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน ๕ วัน

๒. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบเพราะอาจ

ทำให้ได้รับยาเกินขนาด

๓. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต

๔. หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด

ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำตาลลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ ขวดสีขา ๓๐ มิลลิลิตร ในกล่องกระดาษพร้อมหลอดหยด

(๑.๒ มิลลิลิตร) และขวดสีขา ๖๐ มิลลิลิตร ในกล่องกระดาษ

พร้อมช้อนชา

การเก็บรักษา, การแสดงข้อความบนฉลากและเอกสารกำกับยา ให้เป็นไปตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(๕.๕) พลาสเตอร์บรรเทาปวด

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทาง

ยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Borneol 0.21-1.00 %w/w

Camphor 1.00-2.80 %w/w

Caoutchouc 30.00 %w/w

Ethylene Glycol Salicylate 2.00-6.00 %w/w

Eucalyptus Oil 0.50 %w/w

Menthol 0.30-6.49 %w/w

Methyl Salicylate 0.14-6.00 %w/w

Peppermint Oil 0.50-2.00 %w/w

Thymol 0.14-0.50 %w/w

Capsaicin Extract 0.65 %w/w

Polybutene 12.00 %w/w

Capsicum Powder 11.00 %w/w

Capsicum Oleoresin 3.00-11.00 %w/w

และ/หรือ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/w

สรรพคุณ ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

วิธีใช้ เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะปิดให้สะอาดและแห้ง ปิดพลาสติกตรง

บริเวณที่มีอาการปวด ควรเปลี่ยนวันละ ๑-๒ ครั้ง

คำเตือน อย่าใช้พลาสติกนั้บริเวณเยื่ออ่อน ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด

การเก็บรักษา เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ๑๐ แผ่น

(๖) ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก

(๖.๑) ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Chlorpheniramine Maleate 2 mg.

สรรพคุณ บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น้ำมูกไหล

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานทุก ๔-๖ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑-๒ เม็ด ไม่ควรรับประทาน

เกินวันละ ๑๒ เม็ด

เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด ไม่ควรรับประทาน

เกินวันละ ๖ เม็ด

คำเตือน ๑) ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน ๗ วัน

๒) ยานี้ อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือ

ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม

การเก็บรักษา เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

(๗) ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

(๗.๑) ยาน้ำแก้ไอ ขับเสมหะสำหรับเด็ก

ในสูตรตำรับ ๕ มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ammonium Carbonate 0.02 g.

Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml.

สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

วิธีใช้ รับประทานวันละ ๓-๔ ครั้ง

เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๒ ช้อนชา (๑๐ มิลลิลิตร)

เด็ก ๓-๖ ปี รับประทานครั้งละ ๑ ช้อนชา (๕ มิลลิลิตร)

เด็ก ๑-๓ ปี รับประทานครั้งละ $\frac{9}{10}$ ช้อนชา (๒.๕ มิลลิลิตร)

การเก็บรักษา เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร และ ๑๒๐ มิลลิลิตร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗.๒) ยาแก้ไอน้ำดำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับ ๕ มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Glycyrrhiza Fluidextract สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0.6 ml.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Antimony Potassium Tartrate สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1.2-2.0 mg.

Camphorated Opium Tincture 0.6 ml.

สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ และช่วยขับเสมหะ

ขนาดและวิธีใช้ เชย้าขวดก่อนใช้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับประทานวันละ ๓-๔ ครั้ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑-๒ ช้อนชา (๕-๑๐ มิลลิลิตร)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ $\frac{1}{2}$ -๑ ช้อนชา (๒.๕-๕ มิลลิลิตร)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คำเตือน ๑) ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๖ ปี คนชรา และหญิงมีครรภ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒) ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกับนานเกิน ๓ วัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ...% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

การเก็บรักษา เก็บให้พ้นมือเด็ก และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขนาดบรรจุ ขวดละ ๖๐ มิลลิลิตร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๘) ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก

(๘.๑) ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Ammonium Carbonate 3.40 %w/v

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Strong Ammonia Solution สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3.60-6.75 %v/v

สรรพคุณ ดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรือทาผิวหนังบรรเทาอาการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพิษมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิธีใช้ ใช้ซุบสำลีดม หรือใช้ทา

คำเตือน ห้ามรับประทาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร

(๘.๒) ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Menthol 0.07-77.90 %w/v

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Camphor สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0.45-42.00 %w/v

Methyl Salicylate 3.00-15.00 %w/v

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Anise Oil สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0.68 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา %v/v

Burgamot Oil 0.50-0.68 %v/v

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Cajuput Oil สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 0.50-11.00 %v/v

Cassia Oil 0.50 %w/v

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	Clove Oil	1.25	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Dwarf-Pine Needle Oil	1.00	%w/v
	Eucalyptus Oil	1.50-23.00	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Lavender Oil	4.69-8.00	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Peppermint Oil	2.20-10.38	%v/v
	Sage Oil	6.00	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Sassafras Oil	5.00	%w/v
	Turpentine Oil	0.71-8.00	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Capsicum Tincture	4.00-8.00	%v/v
	Myrrh Tincture	1.00	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Ratanghia Tincture	0.40	%v/v
	Terpinol	3.33	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Thymol	0.10	%w/v
	Camphor Spirit	3.00	%v/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Borneo Camphor	9.00	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Bornyl Acetate	0.42	%w/v
	Linalyl Acetate	0.47	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Phenyl Salicylate	0.60	%w/v
	Standard Chamomile Extract	10.00	%w/v
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สรรพคุณ	บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ	
	วิธีใช้	ใช้สูดดม หรือทาบาง ๆ ตามคอและหน้าอก	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	คำเตือน	ห้ามรับประทาน	
	การเก็บรักษา	ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	
	ขนาดบรรจุ	ไม่เกิน ๑๔ มิลลิลิตร	
	(หมายเหตุ	สามารถทำในรูปยาสูดดมหรือยาน้ำสำหรับสูดดม)	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(๘.๓) ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้ง		
	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มี		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สรรพคุณทางยา	หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกันได้แก่	
	Menthol	1.35-3.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Camphor	3.00-9.00	%w/w
	Cajuput Oil	3.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Eucalyptus Oil	0.08-5.00	%w/w
	Terpentine Oil	4.68-5.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สรรพคุณ	บรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอื่นเนื่องจากหวัด	
	วิธีใช้	ทายาที่บริเวณลำคอ หน้าอกและหลัง	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	คำเตือน	ห้ามรับประทาน	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	การเก็บรักษา	ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	

ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๕๐ กรัม

(๙) ยาแก้เมารถ เมาเรือ

(๙.๑) ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Dimenhydrinate

50 mg.

สรรพคุณ ใช้ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ

ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย ๓๐ นาที

คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๕๐°C

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๒ เม็ด

(๑๐) ยาสำหรับโรคตา

(๑๐.๑)^{๑๓}(ยกลึก)

(๑๐.๒) ยาล้างตา

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Sodium Chloride ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับยาตา

ได้แก่ Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 % w/v หรือ

Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01 %w/v ปรับ pH

6-8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม และปรับน้ำยาให้เป็น Isotonic กับน้ำตา

สรรพคุณ ใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา อันเนื่องมาจากผง

ควัน สิ่งสกปรก เข้าตา

วิธีใช้ ใช้ล้างตาวินละ ๒-๓ ครั้ง

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิลิตร^{๑๔}

(๑๑) ยาสำหรับโรคปากและลำคอ

(๑๑.๑) ยากวาดคอ

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Potassium Iodide 2.50 g.

Iodine 1.25 g.

Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml.

Purified Water 2.50 ml.

Peppermint Oil 0.40 ml.

^{๑๓} ข้อ ๒ (๑๐.๑) ยกลึกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

^{๑๔} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๐.๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

	Glycerin to	100.00 ml.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สรรพคุณ	บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ
	วิธีใช้	เติมน้ำสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอในผู้ใหญ่
	คำเตือน	ใช้สำหรับกวาดในคอเท่านั้น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	การเก็บรักษา	ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
	ขนาดบรรจุ	ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร
	(๑๑.๒) ยารักษาเส้นเป็นฝ้า เยนเขียนไวโอเล็ต	
	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Gentian Violet	1 %w/v
	สรรพคุณ	รักษากระพุ้งแก้มและเส้นเป็นฝ้าขาว
	วิธีใช้	ใช้สำหรับชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ ๒-๓ ครั้ง
	คำเตือน	ใช้สำหรับทาในปากเท่านั้น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	การเก็บรักษา	เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐ °C
	ขนาดบรรจุ	ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร และ ๓๐ มิลลิลิตร
	(๑๑.๓) ยาแก้ปวดฟัน	
	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Chlorobutanol	25 g.
	Clove Oil to	100 ml.
	สรรพคุณ	บรรเทาอาการปวดฟัน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	วิธีใช้	ใช้ไม้เล็ก ๆ พันสำหรับยาอุดฟันตรงที่เป็นรู
	คำเตือน	๑) ระงับอย่าให้ถูกบริเวณอื่น
		๒) ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาทันตแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	การเก็บรักษา	เก็บให้พ้นมือเด็ก และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
	ขนาดบรรจุ	ขวดละ ๘ มิลลิลิตร
	(๑๑.๔) ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ	
	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มี	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Abietis Pine Oil	0.30 %v/w
	Anise Oil	0.25 %w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Borneol	1.66-2.00 %w/w
	Cinnamon Oil	0.35 %w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Creosote	0.20 %v/w
	Eucalyptus Oil	0.15-0.16 %w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Lemon Oil	0.30-0.52 %v/w
	Menthol	0.06-5.00 %w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Peppermint Oil	0.19-3.33 %w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Sylvestris Pine Oil	0.30 %v/w

	Licorice Extract	7.31-16.67	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Tincture Capsicum	0.02	%w/w
	Amomum	1.00-4.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Aniseed	2.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Catechu	8.33-38.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Cinnamon	2.00-10.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Clove	0.67-4.00	%w/w
	Costus	0.67	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Fennel	1.67-2.00	%w/w
	Ginger	2.00-8.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Licorice	26.67-71.38	%w/w
	Saffron	2.00	%w/w
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	Saussurea	1.00-3.00	%w/w
	Silver Leaf	0.93	%w/w
	และ/หรือ Honey	1.50-2.40	%w/w

สรรพคุณ ทำให้ชุ่มคอ บรรเทาอาการระคายคอ
 ขนาดและวิธีใช้ ใช้น้ำให้ละลายช้า ๆ ครั้งละ ๑-๕ เม็ด
 (โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์พิจารณา

ตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
 การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น
 ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๑๐๐ เม็ด หรือ ไม่เกิน ๓๐ กรัม
 (๑๑.๕)^๕ ยามอบรรเทาอาการเจ็บคอ

ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg.
 2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg.
 และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg.

สรรพคุณ บรรเทาอาการเจ็บคอ
 ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป
 ๑ เม็ดให้ละลายช้าๆ ในปาก ทุก ๒-๓ ชั่วโมง
 (โดยให้คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผน

ปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์ที่เป็นยาสามัญพิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอ
 ขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน
 ๑) หากใช้ติดต่อกัน ๒ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์
 หรือเภสัชกร

^๕ ข้อ ๒ (๑๑.๕) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

	๒) หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา	
	๓) ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี	
	การเก็บรักษา เก็บยาในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C	
	ขนาดบรรจุ แผงอลูมิเนียมหรือแผงบลิสเตอร์ละไม่เกิน ๘ เม็ด	
	(๑๒) ยาใส่แผล ล้างแผล	
	(๑๒.๑) ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน	
	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
	Iodine	2.0-2.5 %w/v
	Potassium Iodide	2.4-2.5 %w/v
	สรรพคุณ รักษาแผลสด	
	วิธีใช้ ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล	
	คำเตือน ๑) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา	
	๒) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา	
	การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C	
	ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร และ ๓๐ มิลลิลิตร	
	(๑๒.๒) ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอสอล	
	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
	Thimerosal	0.1 % w/v
	สรรพคุณ รักษาบาดแผล	
	วิธีใช้ ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล	
	คำเตือน ๑) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา	
	๒) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา	
	การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C	
	ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ มิลลิลิตร และ ๓๐ มิลลิลิตร	
	(๑๒.๓) ยาใส่แผล โปวีโดน - ไอโอดีน	
	ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
	Povidone-Iodine	10 % w/v
	equivalent to Iodine	1 % w/v
	สรรพคุณ รักษาแผลสด	
	วิธีใช้ ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล	
	คำเตือน ๑) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา	
	๒) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา	
	การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C	
	ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิลิตร ^{๑๖}	
	(๑๒.๔) ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์	

^{๑๖} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๒.๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Isopropyl Alcohol Solution สำนักงาน 70 % v/v

โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090

สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล

วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร^{๑๗}

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๒.๕) ยาเอทิล แอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Ethyl Alcohol Solution สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 70% v/v

โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090

สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล

วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร^{๑๘}

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๒.๖) น้ำเกลือล้างแผล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Sodium Chloride 0.9 % w/v สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล

วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดบาดแผล

การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๑ ลิตร^{๑๙}

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑๒.๗)^{๒๐} น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Chloroxylonol ร้อยละ ๔.๘ โดยน้ำหนักต่อปริมาตร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Isopropyl Alcohol Solution ร้อยละ ๑๒ โดยปริมาตร

สรรพคุณ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล

วิธีใช้ ห้ามใส่แผลโดยตรง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^{๑๗} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๒.๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

^{๑๘} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๒.๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

^{๑๙} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๒.๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

^{๒๐} ข้อ ๒ (๑๒.๗) เพิ่มโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

เจือจางน้ำยา ๑ ส่วนกับน้ำ ๑๙ ส่วน ใช้เช็ดทำความสะอาดรอบ

บาดแผล

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท

ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิลิตร
(๑๓) ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

(๑๓.๑)^{๒๑} (ยกเลิก)

(๑๓.๒)^{๒๒} (ยกเลิก)

(๑๔) ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แผลงัดต่อย

(๑๔.๑) ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน
ได้แก่

Methyl Salicylate 1.14-50.00 %w/w

Camphor 1.76-25.00 %w/w

Menthol 3.00-20.00 %w/w

Cinnamon Oil 1.00-2.40 %w/w

Clove Oil 0.50-5.00 %v/w

Eucalyptus Oil 1.50-13.70 %v/w

Peppermint Oil 0.70-16.00 %w/w

Terpentine Oil 2.00-3.80 %v/w

Capsicum Tincture 0.80-8.00 %v/v

Colophony 2.51 %v/w

สรรพคุณ บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ เนื่องจากแผลงัดต่อยหรือปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ

วิธีใช้ ทาและนวดบริเวณที่มีอาการ

คำเตือน ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ไม่เกิน ๓๐ กรัม

(๑๕) ยาสำหรับโรคผิวหนัง

(๑๕.๑) ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Benzyl Benzoate 25 % w/v

สรรพคุณ รักษาหิด เหา และโลน

วิธีใช้ เชยขาวุดก่อนใช้ยา สำหรับเด็กเล็กให้แบ่งยามาเติมน้ำเท่าตัวแล้ว

^{๒๑} ข้อ ๒ (๑๓.๑) ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

^{๒๒} ข้อ ๒ (๑๓.๒) ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

ผสมให้เข้ากัน

สำหรับรักษาหิด

อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อน ๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน แล้วทายานี้ให้ทั่วทั้งไว้ ๒๔ ชั่วโมง แล้วจึงอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นให้ทาซ้ำใหม่อีกครั้งตามวิธีเดิม

สำหรับรักษาเหาและโลน

ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณที่มีเหาหรือโลน ทั้งไว้ ๑ วัน ถ้าเป็นมากให้ใช้ยา ๒ ครั้งต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมื่อครบ ๗ วันให้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่หายให้ใส่ยาซ้ำตามวิธีเดิม

คำเตือน

ระวังอย่าให้ยาเข้าตา

การเก็บรักษา

เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๒๕°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ

ขวดสีชา ๓๐ มิลลิลิตร และ ๖๐ มิลลิลิตร

(๑๕.๒) ยารักษาหิด ขี้ผึ้งกำมะถัน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sublimed Sulphur

10 %w/w

สรรพคุณ

รักษาโรคหิด

วิธีใช้

ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิด วันละ ๒-๓ ครั้ง

คำเตือน

ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา

การเก็บรักษา

เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ

หลอดละ ๕ กรัม และ ๑๕ กรัม

(๑๕.๓) ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Benzoic Acid

2.5-6.5 % w/w

Salicylic Acid

3.0-5.0 % w/w

สรรพคุณ

รักษา กลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า

วิธีใช้

ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ ๒-๓ ครั้ง

คำเตือน

ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา

การเก็บรักษา

เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ

หลอดละ ๕ กรัม และ ๑๕ กรัม

(๑๕.๔) ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Coal Tar

1% w/w

สรรพคุณ

รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังบางชนิด เช่น เรื้อน กลาก ผื่นคัน

วิธีใช้

ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ ๒-๓ ครั้ง

คำเตือน

ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา

การเก็บรักษา

เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C

ขนาดบรรจุ

หลอดหรือขวดละ ๕ กรัม และ ๑๕ กรัม

(๑๕.๕) ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Calamine 8-15 % w/v
 Zinc Oxide 3-12 % w/v

สรรพคุณ บรรเทาอาการคันเนื่องจากผดผื่นคัน สมพิษ
 วิธีใช้ เชยขาวตก่อนใช้ยา ทาบริเวณที่เป็นวันละ ๓-๔ ครั้ง
 คำเตือน ห้ามรับประทาน
 การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
 ขนาดบรรจุ ขวดละไม่เกิน ๑๘๐ มิลลิลิตร^{๒๓}
 (๑๕.๖) ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 Sodium Thiosulfate 100 % w/w

สรรพคุณ รักษาเกลื้อน
 วิธีใช้ เติมน้ำสะอาดจนถึงคอขวด เขย่าผสมกันจนตัวยาละลายหมด
 (จะได้ความเข้มข้นประมาณ ๒๕%) ใช้ทาบริเวณที่เป็นเกลื้อน หลังอาบน้ำวันละหลายครั้ง
 คำเตือน ยาที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ภายใน ๑๕ วัน
 การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
 ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๕ กรัม สำหรับผสมน้ำเป็น ๖๐ มิลลิลิตร
 (๑๖) ยาบำรุงร่างกาย

(๑๖.๑) ยาเม็ดวิตามินบีรวม
 ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 5 mg.
 Pyridoxine Hydrochloride 2 mg.
 Riboflavine 2 mg.
 Nicotinamide 20 mg.

สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามินบี และบำรุงร่างกาย
 ขนาดและวิธีใช้ รับประทานวันละ ๑ ครั้งหลังอาหาร
 ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑-๒ เม็ด
 เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด
 การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
 ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

(๑๖.๒) ยาเม็ดวิตามินซี
 ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ascorbic Acid 100 mg.

สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามินซี
 ขนาดและวิธีใช้ รับประทานวันละ ๑ ครั้ง
 ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด
 เด็ก ๖-๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด

^{๒๓} ขนาดบรรจุใน ข้อ ๒ (๑๕.๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

คำเตือน	ห้ามใช้เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	การเก็บรักษา	เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	ขนาดบรรจุ	แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด	
	(๑๖.๓) ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
		Ferrous Sulfate Equivalent to Iron	60 mg.
สรรพคุณ	รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่		
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ ๑-๒ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	คำเตือน	๑) ในช่วงรับประทานยาอาจจระจะมีสีดำ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
		๒) หากเกิดอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้ ควรรับประทานยาพร้อม	
	อาหารหรือค่อย ๆ เพิ่มขนาดของยาจนถึงขนาดที่แนะนำให้ใช้		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	การเก็บรักษา	เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔๐°C	
	ขนาดบรรจุ	แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด	
	(๑๖.๔) ยาเม็ดวิตามินรวม		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
		Vitamin A	2,500 I.U.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		Vitamin D	300 I.U.
		Vitamin C	15.00 mg.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		Vitamin B1 Mononitrate	1.00 mg.
		Vitamin B2	0.50 mg.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		Nicotinamide	7.50 mg.
สรรพคุณ	ป้องกันการขาดวิตามินสำหรับผู้ใหญ่		
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานวันละ ๑ เม็ด		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	คำเตือน	ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกิน	
		ขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจาก	
		แพทย์สั่ง	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	การเก็บรักษา	เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด	
	ขนาดบรรจุ	แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด	
	(๑๖.๕) น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		ในสูตรตำรับ ๑ แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ	
		Cod Liver Oil equivalent to	
		Vitamin A	ไม่เกิน 4,000 I.U.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		Vitamin D	ไม่เกิน 300 I.U.
สรรพคุณ	ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D		
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ขนาดและวิธีใช้	ผู้ใหญ่รับประทานวันละ ๑ เม็ด	
	คำเตือน	ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกิน	
		ขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจาก	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		แพทย์สั่ง	

การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ ๔ และ ๑๐ เม็ด

(๑๖.๖) น้ำมันตับปลาชนิดน้ำ

ในสูตรตำรับ ๕ มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาคือ

Cod Liver Oil equivalent to

Vitamin A ไม่เกิน 4,000 I.U.

Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U.

สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D

ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้

เด็กอายุตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป รับประทานวันละ ๑ ช้อนชา

เด็กอายุ ๑-๔ ปี รับประทานวันละ $\frac{๑}{๒}$ ช้อนชา

เด็กแรกเกิด - ๑ ปี รับประทานวันละ $\frac{๑}{๔}$ ช้อนชา

คำเตือน ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดไว้ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง

การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๒๐ มิลลิลิตร ๒๔๐ มิลลิลิตร และ ๔๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๓ ฉลากยาสามัญประจำบ้านตามประกาศฉบับนี้ต้องแสดง

๓.๑ ชื่อยาตามที่ระบุในประกาศนี้ กรณีมีชื่อการค้าต้องแสดงชื่อตามประกาศควบคู่

กับชื่อทางการค้าด้วย

๓.๒ คำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” ในกรอบสี่เหลี่ยมมีขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้

ชัดเจน

๓.๓ คำว่า “ยาสี้นายู” และแสดงวัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ยาสี้นายู

๓.๔ ข้อความอื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕ (๓) หรือมาตรา ๒๗ (๓) แห่ง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วแต่

กรณี

ข้อ ๕ ยาสามัญประจำบ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้

บังคับให้ถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านต่อไปได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๕^{๒๔} ให้ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะทำการผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ซึ่งยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศนี้ และเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วจึงจะผลิตหรือนำหรือส่งยาเข้ามา

^{๒๔} ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ในราชอาณาจักรได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันที่มี
ตำรับยาตามประกาศฉบับนี้ และได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับที่
ประสงค์จะได้ตำรับยานั้น เป็นยาสามัญประจำบ้านโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอแก้ไข
รายการทะเบียนตำรับยา ภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗^๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำนักเป็นต้นไป

กรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กร ทัพพะรังสี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙^{๒๖}

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓)^{๒๗}

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕^{๒๘}

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕^{๒๙}

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐^{๓๐}

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐^{๓๑}

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑^{๓๒}

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยาที่ผลิต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันตามประกาศนี้ ยังคงเป็นยาตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป จนกว่ายานั้นจะสิ้นอายุ

ข้อ ๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบันที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้และมีสูตรตำรับตามข้อ ๒ สามารถขอแก้ไขรายการในทะเบียนตำรับยาได้ และเมื่อได้รับอนุญาตให้แก้ไขทะเบียนตำรับยาแล้ว จึงจะผลิตหรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรได้

^{๒๖} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง/หน้า ๑๒/๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
^{๒๗} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๘๔ ง/หน้า ๔๐/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐
^{๒๘} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๗๔ ง/หน้า ๒๐/๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
^{๒๙} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน้า ๑๐/๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
^{๓๐} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หน้า ๑๘/๔ เมษายน ๒๕๖๐
^{๓๑} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หน้า ๒๐/๔ เมษายน ๒๕๖๐
^{๓๒} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง/หน้า ๗/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

